



Alzheimercentrum Erasmus MC

Erasmus MC



OVERZICHT

1. Ziektebehandeling
2. Symptoombehandeling
3. Gevaar van medicijnen
4. Ondersteuning

1. ZIEKTEBEHANDELING

Er is geen behandeling die de ziekte kan genezen of vertragen.



Erasmus MC



MEDICATIE

Die klachten behandelen die de meeste lijdensdruk geven

Probeer medicatie te stoppen die klachten kunnen geven of verergeren




Erasmus MC



2. SYMPTOOMBEBANDELING

- Motore klachten
- Cognitieve klachten
- Hallucinaties en wanen
- Stemming
- Slaap
- Autonome klachten: plassen, ontlasting, duizeligheid



MOTORE KLACHTEN

Dopamineprecursor (de parkinsonmedicijnen)

Werking: tekort van dopamine in de hersenen aanvullen om de stijfheid te verminderen

Voorbeelden: sinemet, madopar

Bijwerkingen: hallucinaties, wanen, overbeweeglijkheid



Erasmus MC



COGNITIEVE KLACHTEN

Choline-esteraseremmers

Werking: remming afbraak acetylcholine (=boodschapperstof in de hersenen) waardoor betere signaaloverdracht tussen hersencellen

Voorbeelden: rivastigmine (=exelon), galantamine (=reminyl), donepezil

Bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, vallen, hoofdpijn



HALLUCINATIES EN WANEN

1. Choline-esteraseremmers

2. Antipsychotica: alleen clozapine



Werking: blokkade dopamine en serotonine receptoren

Bijwerkingen clozapine: parkinsonisme, slaperigheid, duizeligheid.

Tekort aan wittebloedcellen met als gevaar infectie: frequent bloedcontrole

Erasmus MC

Erasmus

STEMMING

SSRIs: selectieve serotonine heropname remmer

Voorbeelden: citalopram, sertraline



SNRIs: niet-selectieve serotonine heropname remmer

Voorbeelden: venlafaxine, mirtazapine

Werking: remmen van heropname serotonine waardoor er meer beschikbaar is voor signaaloverdracht tussen hersencellen

Bijwerkingen: droge mond, slaperigheid, hoofdpijn

Erasmus MC

The Erasmus MC logo, featuring the name 'Erasmus' in a stylized, cursive blue font.

SLAAP: REM-slaapgedragsstoornissen

1. Benzodiazepinen: clonazepam

Werking: remt de ontlading van zenuwcellen, dus minder signaaloverdracht

Bijwerkingen: slaperigheid, duizeligheid, verwardheid

2. Melatonine (een lichaamseigen stof)

Bijwerkingen: irritatie, slapeloosheid, rusteloosheid



AUTONOME KLACHTEN

1. Duizeligheid bij opstaan: eerst gaan zitten, alvorens te staan, voldoende drinken. Geen medicamenteuze behandeling
2. Problemen met plassen: geen medicamenteuze behandeling
3. Obstipatie: voldoende drinken, veel vezels eten, proberen te bewegen.
Zo nodig laxantia

3. GEVAAR VAN MEDICIJNEN

- De zogenaamde klassieke antipsychotica mogen **NOOIT** worden gebruikt
- Werking: blokkeren dopamine receptoren in de hersenen
- Voorbeeld: haldol
- Risico's: toename op stijfheid, verlaagd bewustzijn met soms overlijden tot gevolg
- Terughoudendheid met nieuwere antipsychotica

4. ONDERSTEUNENDE BEHANDELING

Het nut van een niet medicamenteuze behandeling is niet goed onderzocht.

Fysiotherapie mogelijk effect

Diëtist

Aandacht voor goed slaapritme, duidelijke structuur in het dagelijks leven

Casemanager

